

藥品說明書：使用者須知
復必泰 10 微克/劑 注射用分散體濃縮液
兒童 5-11 歲

COVID-19 mRNA 疫苗 (BNT162b2) (具修飾核苷)

此藥品正受額外上市後監察，這有助快速辨認新的藥品安全資訊。您可以幫忙呈報您的兒童使用後的副作用。請查看第 4 節以了解如何呈報副作用。

本說明書包含重要資訊，在接種本疫苗前請仔細閱讀本藥品說明書的全部內容。

- 請保留本說明書。您可能需要再次閱讀。
- 如有其他任何疑問，請諮詢醫生、藥劑師或護士。
- 如果您的兒童出現任何副作用，請告知醫生、藥劑師或護士。這包括本說明書未列出的任何可能的副作用。請參見第 4 節。

本說明書中有甚麼內容

1. 甚麼是復必泰及其用途
2. 您的兒童在使用復必泰前，需要瞭解甚麼事項
3. 如何給予復必泰
4. 可能出現的副作用
5. 如何儲存復必泰
6. 包裝內容物和其他資訊

1. 甚麼是復必泰及其用途

復必泰是一種適用於預防由 SARS-CoV-2 病毒引起的 COVID-19 的疫苗。

5-11 歲兒童可接種每劑 10 微克的復必泰。

本疫苗可使免疫系統（人體的天然防禦系統）產生對抗該病毒的抗體和血細胞，從而預防 COVID-19。

由於復必泰不含有產生免疫力的病毒，故您的兒童不會導致 COVID-19。

2. 在您的兒童使用復必泰前，需要瞭解甚麼事項

不應給予復必泰

- 如果您的兒童對藥物的活性物質或其他成分有過敏反應（見第 6 節）。

警告和注意事項

如果您的兒童有以下情況，您的兒童使用本疫苗前，請諮詢您的醫生、藥劑師或護士：

- 以往在接種復必泰或任何其他疫苗後，您的兒童曾出現過嚴重過敏反應或呼吸問題。
- 您的兒童對疫苗接種過程感到焦慮，或曾在任何針頭注射後暈倒。
- 您的兒童患有嚴重疾病或伴有高燒的感染。但是，如果您的兒童出現輕微發燒或上呼吸道感染（如感冒），仍可以接種本疫苗。
- 您的兒童有出血問題，容易出現瘀青或正在使用預防血凝塊的藥物。
- 由於 HIV 感染等疾病或影響免疫系統的藥物（如皮質類固醇），您的兒童的免疫系統減弱。

接種復必泰後，出現心肌炎(心臟肌肉發炎)及心包炎(包圍心臟的外膜發炎)的風險會增加。這些情況可於接種後數天之內出現，主要發生於 14 天內。個案更常於接種第 2 劑疫苗後及年輕男士身上出現。與 12 至 17 歲相比，5 至 11 歲兒童患心肌炎和心包炎的風險似乎較低。接種疫苗後，請注意心肌炎及心包炎徵兆的出現，如氣促、心悸、胸口痛。一旦出現這些徵兆，請立即向醫護人員求助。

與任何疫苗一樣，復必泰疫苗可能無法保護所有接種復必泰的患者，尚不清楚您將受到多長時間的保護。

您的兒童可考慮接種第 3 劑復必泰疫苗。即使接種第三劑後，復必泰的功效對於免疫功能低下的人士也可能較低。在此情況下，請繼續採取非藥物干預措施，以預防感染 COVID-19。此外，在合適情況下，您的密切接觸者亦應接受疫苗接種。就個別情況，請諮詢醫生意見。

兒童

現有針對 6 個月至 4 歲嬰幼兒的幼兒疫苗。詳情請參閱復必泰 3 微克/劑 注射用分散體濃縮液的包裝說明書。

復必泰不推薦用於 6 個月以下的幼兒。

其他藥物和復必泰

如果您的兒童正使用、最近已經使用或可能需要使用其他藥物或近期接種過任何其他疫苗，請告知您的醫生或藥劑師。

懷孕和哺乳

如果您的孩子正在懷孕，在接種此疫苗前請告知您的醫生、護士或藥劑師。

懷孕期間可接種復必泰。大量資料顯示，在懷孕中期及晚期接種復必泰，並沒有出現對妊娠或新生嬰兒的負面影響。關於接種後對妊娠初期的影響資料仍然有限，然而，對流產的風險未見有改變。

哺乳期間可接種復必泰。

駕駛車輛和操作機器

第 4 節（可能的副作用）中提到的疫苗接種的某些影響可能會暫時影響您的駕駛車輛或操作機器的能力。請在這些影響消失後再駕駛車輛或操作機器。

3. 如何給予復必泰

稀釋後，在上臂肌肉內注射 0.2 mL 復必泰。

您的兒童將接受 2 次基礎劑注射。

建議你在接種第一劑復必泰後 3 星期，接種第 2 劑相同疫苗，以完成疫苗接種程序。

如您的兒童為免疫功能低下者，他或她可在接種第 2 劑復必泰後最少滿 28 日，接種第 3 劑復必泰。

如接種期間，兒童踏進 12 歲，應繼續獲以每劑 10 微克劑量完成基礎劑注射。

5 至 11 歲的兒童在完成基礎劑接種，後至少滿 6 個月才可注射復必泰加強劑。

關於復必泰使用，如還有任何疑問，請諮詢您的醫生、藥劑師或護士。

4. 可能出現的副作用

與所有疫苗一樣，復必泰可能引起副作用，但並非所有人均會出現副作用。

非常常見的副作用：可能影響患者比例>1/10

- 注射部位：疼痛、腫脹
- 疲倦
- 頭痛
- 肌肉痛

- 寒顫
- 關節痛
- 腹瀉
- 發燒

常見副作用：可能影響患者比例 $\leq 1/10$

- 噁心
- 嘔吐
- 發紅

不常見副作用：可能影響患者比例 $\leq 1/100$

- 淋巴結腫大(接種第3劑後較為常見)
- 感覺不適
- 手臂疼痛
- 失眠
- 注射部位發癢
- 過敏反應，如皮疹或瘙癢
- 感到虛弱或乏力/困倦
- 食慾下降
- 過度出汗
- 夜間盜汗
- 頭暈

罕見副作用：可能影響患者比例 $\leq 1/1,000$

- 暫時性一側面部下垂
- 過敏反應，如蕁麻疹或面部腫脹

非常罕見副作用：可能影響患者比例 $\leq 1/10,000$

- 可導致氣促、心悸、胸口痛的心臟肌肉發炎(心肌炎)及包圍心臟的外膜發炎(心包炎)

未知（無法根據現有資料估算）

- 嚴重過敏反應
- 接腫手臂大範圍腫脹
- 面部腫脹(面部腫脹或出現於曾接受面部皮膚填充劑注射的人身上)

- 導致皮膚出現紅點或紅色斑塊、呈靶狀或像似由淺紅色環狀包圍內為一暗紅中心點的「牛眼」之皮膚反應 [多形性紅斑 (英：Erythema multiforme)]
- 異常皮膚感覺，例如刺痛或爬行感 [感覺異常(英：paraesthesia)]
- 感覺或敏感度減退，尤其皮膚上 [感覺減退(英：hypoesthesia)]
- 月經過多（大多數個案性質屬非嚴重及暫時性）

副作用的報告

如果您的兒童出現任何副作用，請告知醫生、藥劑師或護士。這包括本說明書內未列出的任何可能的副作用。您也可以通過本地呈報系統直接呈報副作用，如適用，應標明批號。通過呈報副作用，您可以幫助提供關於本藥品安全性的更多資訊。

5. 如何儲存復必泰

請將本品放置在兒童不可見且接觸不到的地方。

以下有關儲存、有效期、使用和處理的資訊僅供專業醫護人員使用。

在包裝盒和標籤上註明的有效期過後，請勿使用本品。有效期是指當月的最後一天。

在冷凍櫃-90°C至-60°C保存。

在原包裝中避光儲存。

疫苗需在-90°C至-60°C冷凍下接收。接收後，冷凍的疫苗可在-90°C至-60°C或2°C至8°C下保存。

在-90°C至-60°C冷凍保存下，10 個小瓶裝的疫苗可於 2°C 至 8°C 下解凍 4 小時，每瓶疫苗或可於室溫(最高 30°C)下解凍 30 分鐘。

於有效期內，從冷凍櫃取出後，未開封的小瓶可在冷凍櫃以 2°C 至 8°C 最多保存 10 星期包括運輸。應在外包裝上標記在 2°C 至 8°C 下新的丟棄日期。本疫苗在解凍後不得重新冷凍。

使用前, 未開封的小瓶可於 8°C - 30°C 存放最多 12 小時。

解凍小瓶可在室內光照條件下處理。

疫苗在稀釋後，於 2°C -30°C 儲存，並在 12 小時內使用，包括最多 6 個小時的運輸時間在內。應丟棄任何未使用的疫苗。

如果發現本疫苗在稀釋後有顆粒物或變色，請勿使用。

請勿通過污水或家居垃圾處理任何藥物。向您的藥劑師諮詢如何丟棄您不再使用的藥物。這些措施將有助於保護環境。

6. 包裝內容物和其他資訊

復必泰所含成分

- 活性物質為 COVID-19 mRNA 疫苗。稀釋後，每小瓶含 10 個 0.2 mL 劑量，每劑含 10 微克 mRNA 疫苗。
- 其他成分包括：
 - ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315)
 - 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)
 - 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
 - cholesterol
 - trometamol
 - trometamol hydrochloride
 - sucrose
 - water for injections

復必泰外觀和包裝內容物

疫苗為白色至類白色分散體（pH：6.9-7.9），裝於 2 mL 透明多劑小瓶（I 類玻璃瓶）中，每瓶含 10 劑，配有橡膠瓶塞並用橙色鋁塑易掀蓋密封。

包裝規格：1, 3 及 10 個小瓶裝。

文稿日期：2023 年 1 月 13 日

如對產品有任何疑問，請致電 +852-800938618 或電郵到 infohk@fosunpharma.com。